

Sir John b.v.
Zuidbaan 511
2841 MD Moordrecht
T. 0182-396931
E. info@sir-john.nl

Calciumgluconaatgel

Bevat:

Per gram hydrogel calciumgluconaat 25 mg, chloorhexidine(digluconaat) 5 mg.

Eigenschappen:

Bindt fluorwaterstofzuur tot oplosbaar calciumfluoride waardoor penetratie van fluorwaterstofzuur door de huid wordt voorkomen. De vrijkomende waterstofionen worden gebonden tot niet toxisch zwak zuur (gluconzuur). Chloorhexidine is toegevoegd ter profylaxe van infecties en als conserveermiddel.

Indicaties:

Voor lokale toepassing op door fluorwaterstofzuur aangedane huidgedeeltes.

Bijwerkingen:

Zelden allergische en/of overgevoeligheidsreacties.

Waarschuwingen / voorzorgen:

Bij bekende allergie voor chloorhexidine en antihistaminicum oraal of parenteraal toedienen.

Dosering:

Het aangedane huidgedeelte eerst langdurig spoelen met veel stromend water, daarna zo snel mogelijk de hydrogel aanbrengen in een laag van ca. 5 mm. Na 2 minuten deze laag wegwassen en een nieuwe laag aanbrengen. Dit herhalen tot de pijn wegtrekt. De laatste laag laten indrogen.

CFH advies:

Calciumgluconaat hydrogel FNA kan worden toegepast bij een door fluorwaterstofzuur aangedane huid.

Opmerking:

Bezoek een arts bij blijvende pijn of irritatie.